

Gözleme Dayalı Değerlendirme Ölçütü

MOXO Testi sırasında doldurunuz.

Kişi Adı: _____

Tarih : _____ Saat: _____

İlaç: kullanılıyor/kullanılmıyor, ilaç tipi ve dozajı: _____

Aşağıdaki kategorilerin her biri için, 0 ile 4 arasındaki puanlardan hastanızın test sırasındaki davranışlarını en iyi tanımlayan puanı seçiniz. 0, test sırasında söz konusu davranışın gösterilmediğini ve 4, bu davranışın test sırasında önemli ölçüde gösterildiğini ifade etmektedir.

	Davranış gösterilmemiştir		Davranış önemli ölçüde gösterilmiştir		
	↑				↑
Kişinin testi anlayabilmesi için, testin başında bulunan "deneme" bölümünün ikiden fazla kez tekrar edilmesi gerekmiştir.	0	1	2	3	4
Test sırasında kendi kendine konuşmuştur.	0	1	2	3	4
Test sırasında uygulayıcıyla konuşmuştur.	0	1	2	3	4
Test sırasında bilgisayarla konuşmuştur.	0	1	2	3	4
Sandalyesinde durmadan kıpırdanmıştır.	0	1	2	3	4
Klavye üzerinde kullandığı elini değiştirmiş, iki elini de kullanmıştır.	0	1	2	3	4
Etrafa bakmıştır.	0	1	2	3	4
Bacaklarını kıpırdatmış, bir aşağı bir yukarı oynatmıştır.	0	1	2	3	4
Sabrını kaybetmiştir.	0	1	2	3	4
Test sırasında motive edilmeye ihtiyaç duymuştur.	0	1	2	3	4
Bilgisayar ekranına olan ilgisini kaybetmiştir.	0	1	2	3	4
Test sırasında yorulmuştur.	0	1	2	3	4
Görsel çeldirici içeren bölümlerde teste daha fazla odaklanmıştır.	0	1	2	3	4
Görsel çeldirici içeren bölümlerde teste daha az odaklanmıştır.	0	1	2	3	4
İşitsel çeldirici içeren bölümlerde teste daha fazla odaklanmıştır.	0	1	2	3	4
İşitsel çeldirici içeren bölümlerde teste daha az odaklanmıştır.	0	1	2	3	4
Kombine çeldirici içeren bölümlerde teste daha fazla odaklanmıştır.	0	1	2	3	4
Kombine çeldirici içeren bölümlerde teste daha az odaklanmıştır.	0	1	2	3	4

Yukarıda bulunan kategoriler, test sırasında tipik olarak görülen davranışları tanımlamaktadır. Test uygulayıcıları, ihtiyaç duyduklarında Gözleme Dayalı Değerlendirme Ölçütü'ne ilave kategoriler ekleyebilirler.